

Geschützte Pflanzen in Graubünden

Region Surselva (Vorderrhein)



Das Wanzen-Knabenkraut wächst in Graubünden
praktisch ausschliesslich in der Surselva.



Amt für Natur und Umwelt
Uffizi per la natura e l'ambiente
Ufficio per la natura e l'ambiente





Inhaltsverzeichnis

Geschützte Arten	2
Zum Merkblatt	2
Die Pflanzenwelt in der Region Surselva	3
Weitere schutz- bedürftige Pflanzen	3
Lebensräume	4
Ufer, Feuchtgebiete	5
Fels, Schutt, Geröll	6
Wiesen, Weiden	7
Gebüsche, Hochstaudenfluren, Krautsäume	8
Wälder	9
Artporträts	10
Index	108
Weitere Informationen	112
Kontakt	112
Impressum	112





Geschützte Arten

Zahlreiche Pflanzenarten sind bundesrechtlich oder kantonal geschützt.

Es handelt sich um Pflanzen, die nicht unbedingt selten, aber durch übermässiges Sammeln bedroht sind, zum Beispiel attraktive Arten, Heilpflanzen oder Arten, die nur an einem bestimmten Ort vorkommen.

Geschützte Arten dürfen nicht geplückt, ausgegraben, ausgerissen, weggeführt, angeboten, verkauft, gekauft oder vernichtet werden.

Zum Merkblatt

Das Merkblatt stellt die in der Sur selva geschützten Arten kurz in Bild und Wort vor. Da der Lebensraum entscheidend dafür ist, Pflanzen zu erkennen und gezielt zu schützen, sind auch die wichtigsten Lebensräume der Region kurz beschrieben.

Das Merkblatt richtet sich vor allem an

- ★ **Gemeinden**
- ★ **Naturpärke**
- ★ **Tourismusorganisationen**
- ★ **Schülerinnen und Schüler**
- ★ **pflanzeninteressierte Privatpersonen**



Die Pflanzenwelt in der Surselva



In der Surselva befinden sich drei Landschaften von nationaler Bedeutung (BLN) mit jeweils charakteristischen Lebensräumen: Greina – Piz Medel, Lai da Tuma und Ruinaulta.

Greina – Piz Medel ist vor allem geprägt durch hochalpine Schwemmenbenen und Gletschervorfelder. Das Gebiet Lai da Tuma (Quellgebiet des Rheins) weist zahlreiche, meist national bedeutende Flachmoore auf. Die Ruinaulta (Rheinschlucht) zeichnet sich durch eine unverbaute Auenlandschaft im Talboden und orchideenreiche Erika-Föhrenwälder an den südexponierten Erosionshängen aus. Sie ist auch Bestandteil des Smaragdnetzwerks, das europaweit besonders wertvoll Lebensräume schützt.

Über diese Gebiete hinaus finden sich in der Surselva verschiedene weitere Lebensräume, darunter wertvolle Trockenwiesen und -weiden, einige Hochmoore von nationaler Bedeutung sowie zahlreiche Waldreservate. Sie alle tragen zu einer hohen Pflanzenvielfalt bei.

In der Surselva gibt es gut 90 geschützte Pflanzenarten. Speziell für die Region sind zum Beispiel Frauenschuh (Artporträt S. 90), Zwerp-Rohrkolben (Artporträt S. 35), Wanzen-Knabenkraut (Artporträt S. 68) und Virginische Mondraute (Artporträt S. 84).



Weitere schutzbedürftige Pflanzen

Neben den gesetzlich geschützten sind viele weitere Pflanzenarten schutzbedürftig. In der Region Surselva sind dies insbesondere folgende seltene und gefährdete Arten:

- Der **Schnabelfrüchtige Bergflachs** wächst in der Schweiz nur in Trockenwiesen und Föhrenwäldern im Gebiet Ilanz bis Domat sowie in Nordzürich.
- Die **Kastanien-Binse** gedeiht in Quellfluren der alpinen Stufe. Sie kommt in der Schweiz nur in den Regionen Viamala und Surselva vor.

- Der **Alpen-Knorpelsalat** wächst auf Kalkschotter in der Auenlandschaft. In der Schweiz sind nur Vorkommen in der Ruinaulta und in den Rheinauen bei Thusis nachgewiesen. Der Kanton hat einen Aktionsplan zum Schutz und zur Förderung dieser Art erstellt.
- Das **Dreiblättrige Schaumkraut** ist in Graubünden einzig aus einem Fichtenwald westlich von Versam bekannt.

Helfen Sie mit, die Natur zu erhalten – lassen Sie die Pflanzen wachsen.

Lebensräume

Pflanzen sind sesshafte Lebewesen, das heisst, sie können nicht aktiv ihren Standort wechseln, um sich günstigere Lebensbedingungen zu suchen. Deshalb sind sie meist an bestimmte Lebensräume gebunden und an die dortigen Nährstoff-, Wasser- oder Lichtverhältnisse angepasst. So wachsen in einem nährstoffarmen, feuchten Moor

zum Beispiel ganz andere Pflanzen als auf einer trockenen, sonnigen Heide.

Der Lebensraum liefert oft wertvolle Hinweise darauf, welche Pflanzenarten dort vorkommen können und welche nicht. Entsprechend hilft er dabei, Arten zu erkennen und gezielt zu schützen. Deshalb werden im Folgenden die wichtigsten Lebensräume der Region kurz vorgestellt.



Ufer, Feuchtgebiete

Ufer und Feuchtgebiete beherbergen verschiedene Lebensräume, die alle vom Wasser geprägt sind. Neben den Uferzonen fliessender und stehender Gewässer gehören auch Moore und Feuchtwiesen dazu.

Uferlebensräume, z. B. Röhrichte, verbinden das Wasser mit dem Land. In der Surselva sind die Ufer zahlreicher Flüsse prägend, darunter in erster Linie der Vorderrhein. Beispiele geschützter Uferpflanzen sind die Gelbe Schwertlilie (Artporträt S. 28) oder der Fieberklee (Artporträt S. 29).

Moore sind wassergesättigte und nährstoffarme Lebensräume mit hochspezialisierten Pflanzenarten. Man unterscheidet grob zwischen Flach- und Hochmooren. **Flachmoore** (oft auch Ried- oder Streuwiesen genannt) werden in der Regel durch Grund- oder Hangwasser gespeist. Sie liegen oft in Mulden- oder Hanglagen. Die Surselva weist zahlreiche Flachmoore von nationaler Bedeutung auf. Typische geschützte Pflanzen sind das Schmal- und das Breit-

blättrige Wollgras (Artporträt S. 22 und S. 24) und verschiedene Orchideenarten, z. B. die Breitblättrige Fingerwurz (Artporträt S. 16).

Hochmoore beziehen ihr Wasser hauptsächlich aus Niederschlägen. Sie zeichnen sich insbesondere durch ihre typischen Torfmoose aus. Die abgestorbenen Moosteile bilden oft hoch aufgewölbte Torfschichten (daher der Name «Hochmoor»). Schweizweit sind Hochmoore sehr selten geworden. In den Gemeinden Trun, Medel und Disentis kommen noch einige grössere Flächen vor. Ein typischer Vertreter der Hochmoorpflanzen ist der Rundblättrige Sonnentau, eine fleischfressende Pflanze (Artporträt S. 19).

Feuchte Wiesen befinden sich oft im Übergangsbereich zwischen Mooren und trockenerem Gelände. Dabei kann der Lebensraum auch zeitweilig austrocknen. Die Gefleckte Fingerwurz (Artporträt S. 15) ist eine charakteristische Vertreterin solcher Wiesen.



Fels, Schutt, Geröll

Dieser Lebensraumbereich ist durch Gesteinsmaterial unterschiedlicher Beschaffenheit und das Fehlen einer Bodenschicht gekennzeichnet. Ausserdem ist er oft sehr starken täglichen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Die Artenzusammensetzung dieser hochspezialisierten Pioniergehölze hängt auch von der chemischen Zusammensetzung, der Bewegung des Gesteins sowie dessen Form und Grösse ab. Neben nacktem Felsen gehören Alluvionen (Schwemmebenen von Flüssen und Bächen), Moränen zurückweichender Gletscher und Steinschutt- und Geröllfluren zu diesem Lebensraumbereich.

Alluvionen, Moränen und Stein-schutt- und Geröllfluren bestehen überwiegend aus grobkörnigem, durchlässigem Sand, Kies oder Geröll. Überschwemmungen oder

Hangrutsche lagern dieses Gesteinsmaterial immer wieder um, sodass sich kaum Feinerde ansammelt und sich keine geschlossene Pflanzendecke bilden kann. In der Surselva sind solche Standorte im Hochgebirge häufig. Ein typischer Vertreter auf kalkarmem Schutt oder Moränen ist z. B. der Alpen-Mannsschild (Artporträt S. 37).

Auf nacktem **Felsen**, wie er im Gebirge der Surselva häufig vorkommt, können nur sehr spezialisierte Flechten, Moose und Pilze wachsen. In den Ritzen und Spalten gelingt es aber auch einigen Blütenpflanzen, sich anzusiedeln, z. B. dem Himmelsherold (Artporträt S. 42) oder der Aurikel (Artporträt S. 43).



Wiesen, Weiden

Ein beachtlicher Teil der Surselva ist von **Wiesen** und **Weiden** bedeckt. Unterhalb der Waldgrenze sind diese an trockenen Südhängen besonders artenreich und gelten als Hotspots der Biodiversität. Die hohe Biodiversität ist unseren Vorfahren und ihrer Bewirtschaftungsart (Fällen von Bäumen, extensive Beweidung ohne zusätzliche Düngung, partielle und nicht häufige Mahd) zu verdanken. Graslandarten, die ursprünglich an Felsen, in Auen, in alpinen Rasen, in Steppenrasen in Osteuropa, im Mittelmeergebiet oder in Trockenwäldern gediehen, wanderten ein und bildeten blütenreiche Wiesen und Weiden.

Feuerlilie (Artporträt S. 81), Pracht-Nelke (Artporträt S. 56) und zahlreiche Orchideen sind typische geschützte Arten dieser Lebensräume. Daneben beherbergen sie auch eine Vielzahl von Tieren, insbesondere Vögel, Tagfalter, Heuschrecken und Wildbienen.

Auf den Wiesen und Weiden oberhalb der Baumgrenze wachsen von Natur aus keine Bäume. Diese sogenannten alpinen Rasen sind geprägt von verschiedenen geschützten Alpenpflanzen wie dem Edelweiss (Artporträt S. 61) oder der Männertreu (Artporträt S. 64 und S. 65).



Gebüsche, Hochstaudenfluren, Krautsäume

Unter **Gebüschen** versteht man Lebensräume mit Gehölzen, in denen die Bäume nicht dominieren, z.B. **Waldränder, Hecken und Feldgehölze**. Sie bilden besonders im intensiv genutzten Kulturland – im Verbund mit angrenzendem Grünland – ein wichtiges Lebensraummosaik. Aber auch die in höheren Lagen häufigen **Grünerlenbestände** und **Zwergstrauchheiden** zählen zu den Gebüschen. In letzteren lässt sich zum Beispiel gelegentlich die Grüne Hohlzunge, eine Orchideenart (Artporträt S. 54), finden.

Oft sind Gebüsche von vorgelagerten Streifen gesäumt, die meist aus krautigen Pflanzenarten bestehen. Diese **Krautsäume** vertragen im Gegensatz zum Grünland keine

regelmässige Mahd oder Beweidung. Es wachsen dort beispielsweise das Weisse Waldvögelein (Artporträt S. 85) oder der Berg-Drachenkopf (Artporträt S. 57).

Hochstaudenfluren bestehen aus hochwüchsigen krautigen Pflanzen mit meist grossen Blättern. Sie gedeihen vorwiegend auf nährstoffreichen, feuchten Böden, z. B. in **Fichtenwäldern, Grünerlengebüschen** oder **Lawinenrungen**. Der Hohe Rittersporn (Artporträt S. 79) ist ein typischer Vertreter der Hochstaudenfluren in den höheren Lagen der Surselva.



Wälder

Der **Wald** ist seit jeher eine wichtige Lebensgrundlage für den Menschen. Er schützt vor Lawinen und Steinschlag, liefert Bau- und Brennholz, speichert CO₂, ist Lebensraum für Pflanzen, Pilze und Tiere und bietet Erholung.

Die unteren Lagen der Surselva sind vielerorts bewaldet. Je nach Höhenlage, Bodenbeschaffenheit, Klima und Bewirtschaftung unterscheiden sich die Wälder stark in ihrem Aussehen und ihrer Artenzusammensetzung. In den untersten Tallagen der Surselva wachsen **Laubmischwälder** mit Weisserlen, Eschen, Bergahor-nen und Linden. Eine Besonderheit bietet die Ruinaulta: Dort gedeihen einerseits bedeutende **Auenwälder**, andererseits an trockenen Stand-orten orchideenreiche **Waldföhren-bestände**, in denen beispielweise die Fliegen-Ragwurz (Artporträt S. 66) anzutreffen ist.

Steigt man von den Tallagen in die Höhe, werden die Laubmischwälder von **Tannen-Fichtenwäldern** und spä-ter von **Fichtenwäldern** abgelöst. Charakteristisch für schattige, moos-reiche Fichtenwälder sind zum Beispiel die Korallenwurz (Artporträt S. 88) und die Moosorchis (Artporträt S. 98).

Zuoberst im Val Medel und bei Vals kommen zum Teil auch **Lärchen-Arvenwälder** vor, die man sonst in Graubünden vor allem aus inneralpinen Gebieten wie dem Engadin kennt.



Die Artporträts

Die Artporträts erscheinen in folgender Reihenfolge: Sie sind zunächst nach dem Hauptlebensraum sortiert, also Feuchtgebiete, Felsen, Wiesen,

Gebüsche, Wälder. Innerhalb der Lebensräume sind sie alphabetisch nach dem wissenschaftlichen Namen geordnet.

Bild mit Bildautor

Name

Deutsch, Italienisch,
Wissenschaftlich

Lebensräume

Zuerst wird der Hauptlebensraum genannt. Danach folgen die weiteren Lebensräume. Die Balkenlänge gibt die Wichtigkeit an.

Pflanzenfamilie, Blütezeit, Grösse

Zusätzliche Informationen



Blutrote Fingerwurz
Orchidee sanguinea
Dactylorhiza cruenta

Ufer, Feuchtgebiete

Pflanzenfamilie
Orchideengewächse

Blütezeit
Juni - Juli

Grösse
10 - 30 cm



Die Blutrote Fingerwurz ist die einzige Fingerwurzart mit beidseitig gefleckten Blättern. In der Schweiz wächst sie vorwiegend in Graubünden und dort vor allem in kalkreichen Flachmooren.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenförderung



Verbreitungskarte

Die dunkel markierten Gemeinden zeigen, in welchen Gemeinden der behandelten Region die Pflanze vorkommt. Daten: InfoFlora (Stand Januar 2024).



Amt für Natur und Umwelt
Uffizi per la natura e l'ambiente
Ufficio per la natura e l'ambiente



Fingerwurzen

Die Arten der Fingerwurzen sind sich zum Teil sehr ähnlich und bastardieren auch miteinander. Sie sind Nektartäuschblumen, d. h. sie locken Bestäuber durch Farbe, Duft und Form der Blüten an, ohne Nektar anzubieten. Bei allen Arten lädt die Lippe (mittleres Blütenblatt) die Insekten ein, auf der weit geöffneten Blüte zu landen. Oft weisen ihnen Punkte oder Linien den Weg zum Sporn, wo sie den Nektar vermuten. Dringt ein Insekt dorthin vor, heften sich die Pollenpakete der Blüte durch einen ausgeklügelten Mechanismus an seinen Kopf oder Rücken. Dabei müssen Grösse der Blüten und Grösse der wichtigsten Bestäuberinsekten – bei den Fingerwurzen sind das oft bestimmte Hummeln – zueinander passen.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Blutrote Fingerwurz **Orchide sanguigna** ***Dactylorhiza cruenta***

Ufer, Feuchtgebiete

Pflanzenfamilie


Orchideengewächse

Blütezeit

Juni - Juli

Grösse

10 - 30 cm



Die Blutrote Fingerwurz ist die einzige Fingerwurzart mit beidseitig gefleckten Blättern. In der Schweiz wächst sie vorwiegend in Graubünden und dort vor allem in kalkreichen Flachmooren.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





© Josef Hartmann


Fleischrote Fingerwurz **Orchidee palmata** ***Dactylorhiza incarnata***

Ufer, Feuchtgebiete

Pflanzenfamilie
Orchideengewächse

Blütezeit
Mai – Juli

Grösse
20 – 60 cm



Charakteristisch für diese Fingerwurzart sind die steil aufgerichteten, meist ungefleckten Blätter. Sie wächst in feuchten Wiesen und kalkreichen Flachmooren.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





© Josef Hartmann

Lappländische Fingerwurz Orchide della Lapponia *Dactylorhiza lapponica*

Ufer, Feuchtgebiete

Pflanzenfamilie


Orchideengewächse

Blütezeit

Juni - August

Grösse

10 - 30 cm



Die Lappländische Fingerwurz zeichnet sich durch einen lockeren Blütenstand aus. Sie wurde erstmals in Lappland beschrieben, wo sie auch heute noch verbreitet vorkommt. In der Schweiz ist sie in Flach- und Hangmooren sowie an lehmigen Rutschhängen zu finden.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Gefleckte Fingerwurz

Orchide macchiata

Dactylorhiza maculata

**Ufer,
Feuchtgebiete**

Wiesen, Weiden

Wälder

Pflanzenfamilie


Orchideengewächse

Blütezeit

Mai - August

Grösse

20 - 60 cm



Die Gefleckte Fingerwurz ist durch lila oder rosa bis weisse Blüten und gefleckte, eiförmige Grundblätter gekennzeichnet. Sie ist die häufigste Fingerwurzart der Schweiz und wächst in basisch bis neutralen, feuchten Wiesen und Wäldern.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Breitblättrige Fingerwurz

Orchide a foglie larghe

Dactylorhiza majalis

Ufer, Feuchtgebiete

Pflanzenfamilie


Orchideengewächse

Blütezeit

Mai - Juli

Grösse

15 - 45 cm



Die Breitblättrige Fingerwurz zeichnet sich durch einen dicken, hohlen Stängel und breit-lanzettliche, oberseits meist deutlich gefleckte Laubblätter aus. Sie kommt in kalkreichen Flachmooren und nährstoffreicheren Nasswiesen vor.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Traunsteiners Fingerwurz **Orchidee di Traunsteiner** ***Dactylorhiza traunsteineri***

Ufer, Feuchtgebiete

Pflanzenfamilie


Orchideengewächse

Blütezeit

Mai - Juni

Grösse

20 - 35 cm



Die Traunsteiners Fingerwurz weist schmal-lanzettliche Grundblätter und intensiv purpurrote Blüten auf. Sie ist nach einem Tiroler Apotheker namens Traunsteiner benannt und wächst in feuchten Wiesen und Flachmooren.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





© Josef Hartmann

Langblättriger Sonnentau *Drosera a foglie allungate* *Drosera anglica*

Ufer, Feuchtgebiete

Pflanzenfamilie


Sonnentaugewächse

Blütezeit

Juli - August

Grösse

10 - 30 cm



Diese Art wächst vor allem in Flachmooren mit eher kalkreicher Natur. Sie kommt in der ganzen Schweiz vor, ist aber überall selten. Ihre Blätter sind deutlich länger als breit und liegen nicht direkt dem Boden an.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Rundblättriger Sonnentau **Drosera a foglie rotonde** ***Drosera rotundifolia***

Ufer, Feuchtgebiete

Pflanzenfamilie


Sonnentaugewächse

Blütezeit

Juli - August

Grösse

5 - 12 cm



Der Rundblättrige Sonnentau ist die häufigste Sonnentauart der Schweiz. Er ist typisch für Hochmoore und wächst immer zusammen mit Torfmoosen. Seine Blätter sind rundlich und liegen meist flach am Boden.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





© Josef Hartmann


Sumpf-Stendelwurz **Elleborine palustre** ***Epipactis palustris***

Ufer, Feuchtgebiete

Pflanzenfamilie
Orchideengewächse

Blütezeit
Juni - August

Grösse
20 - 50 cm



Die Sumpf-Stendelwurz ist die einzige einheimische Art dieser Gattung, die in Flachmooren und Sumpfwiesen wächst. Ihre Blüten hängen wie in einer lockeren Traube.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Wollgräser

Wollgräser blühen bereits ab April. Richtig auffällig sind sie aber erst nach der Blüte, wenn sie einen Wollschoß aus unzähligen weissen Fäden bilden, an denen winzige Samen hängen. Die Fäden erscheinen weiss, weil sie viel Luft enthalten – ein Vorteil, wenn der Wind sie wie Fallschirme möglichst weit fortbläst.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung






Schmalblättriges Wollgras **Pennacchi a foglie strette** ***Eriophorum angustifolium***

Ufer, Feuchtgebiete

Pflanzenfamilie
Sauergräser

Blütezeit
April - Juni

Grösse
20 - 50 cm



Beim Schmalblättrigen Wollgras trägt jeder Stängel mehrere «Wollmützen». Die Art wächst in kalkfreien Flachmooren und ist in der ganzen Schweiz vom Tiefland bis ins Hochgebirge verbreitet.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Zierliches Wollgras

Pennacchi gracili

Eriophorum gracile

Ufer, Feuchtgebiete

Pflanzenfamilie
Sauergräser

Blütezeit
Mai

Grösse
20 – 50 cm



Wie das Schmalblättrige Wollgras trägt auch das Zierliche Wollgras pro Stängel mehrere «Wollmützen». Es ist in der Schweiz stark gefährdet und kommt vor allem in Flachmooren des Mittellands vor. In der Surselva konnte das Zierliche Wollgras seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr nachgewiesen werden.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Breitblättriges Wollgras

Pennacchi a foglie larghe


Eriophorum latifolium

Ufer, Feuchtgebiete

Pflanzenfamilie
Sauergräser

Blütezeit
April - Mai

Grösse
20 - 50 cm




Das Breitblättrige Wollgras ist in Aussehen und Verbreitung dem Schmalblättrigen Wollgras sehr ähnlich. Es wächst jedoch in kalkhaltigen Flachmooren.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung






Scheuchzers Wollgras **Pennacchi di Scheuchzer** ***Eriophorum scheuchzeri***

Ufer, Feuchtgebiete

Pflanzenfamilie
Sauergräser

Blütezeit
Juni - August

Grösse
bis 30 cm



Beim Scheuchzers Wollgras trägt jeder Stängel nur eine einzige, schneeweisse «Wollmütze». Es ist vorwiegend in den Alpen zu finden und wächst dort in kalkarmen Verlandungszonen von Tümpeln und kleinen Seen und Flachmooren.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung






Scheiden-Wollgras
Pennacchi guainati
Eriophorum vaginatum

Ufer, Feuchtgebiete

Pflanzenfamilie
Sauergräser

Blütezeit
April - Mai

Grösse
20 - 70 cm



Wie beim Scheuchzers Wollgras trägt auch das Scheiden-Wollgras nur eine einzige «Wollmütze». Ausserdem ist bei dieser Art der oberste Blattansatz deutlich scheidig aufgeblasen. Es kommt in Torfmooren, moorigen Wäldern und Zwerstrauchheiden vor.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Schwalbenwurz-Enzian

Genziana asclepiade

Gentiana asclepiadea

Ufer,
Feuchtgebiete

Wiesen, Weiden

Wälder

Gebüsche,
Hochstaudenfluren,
Krautsäume

Pflanzenfamilie


Enziangewächse

Blütezeit

August - Oktober

Grösse

30 - 90 cm



Der Schwalbenwurz-Enzian ist die grösste einheimische Enzianart mit blauen, glockenförmigen Blüten. Charakteristisch sind auch die relativ breiten, geaderten Blätter. Die Art kommt in feuchten Wäldern, Weiden, Riedwiesen und Staudenfluren vor.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





© Josef Hartmann

Gelbe Schwertlilie *Giaggiolo acquatico* *Iris pseudacorus*

Ufer, Feuchtgebiete

Pflanzenfamilie


Schwertliliengewächse

Blütezeit

Juni

Grösse

50 – 100 cm



Die Gelbe Schwertlilie kommt in Graubünden nur an wenigen Stellen vor. Im Mittelland und Jura ist sie hingegen an Ufern, im Röhricht und in Gräben weit verbreitet.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Fieberklee Trifoglio fibrino *Menyanthes trifoliata*

Ufer, Feuchtgebiete

Pflanzenfamilie


Fieberkleegewächse

Blütezeit

Mai - Juni

Grösse

15 – 30 cm



Der Name «Klee» leitet sich von den dreiteiligen, kleeartigen Blättern ab, obwohl die Pflanze nicht mit dem Klee verwandt ist. Sie wächst in Moortümpeln vom Flachland bis auf über 2000 m ü. M. und wurzelt oft direkt im Wasser.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Fettblätter

Die Fettblätter gehören zu den fleischfressenden Pflanzen. Ihre Blätter sind durch Drüsensekrete fettig glänzend. Kleine Insekten bleiben daran haften und werden verdaut. Dank dieser Zusatznahrung können die Fettblätter sehr nährstoffarme Böden besiedeln



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Alpen-Fettblatt Erba una bianca *Pinguicula alpina*

Ufer, Feuchtgebiete

Fels, Schutt,
Geröll

Wiesen, Weiden

Pflanzenfamilie


Wasserschlauchgewächse

Blütezeit

Mai - Juli

Grösse

5 - 15 cm



Das Alpen-Fettblatt ist die einzige Fettblattart der Schweiz mit weissen Blüten. Entgegen ihrem Namen kommt sie auch in höheren Lagen des Mittellandes und vereinzelt im Jura vor.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





© Josef Hartmann

Dünnsporniges Fettblatt Erba unta bianco-maculata *Pinguicula leptoceras*

Ufer, Feuchtgebiete

Pflanzenfamilie


Wasserschlauchgewächse

Blütezeit

Juni - August

Grösse

5 - 15 cm



Das Dünnspornige Fettblatt wächst vorwiegend in den Süd- und Zentralalpen. Es sieht dem Gemeinen Fettblatt sehr ähnlich. Am besten lassen sich die beiden Arten an der Form der Blütenunterlippe und der Frucht unterscheiden.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Gemeines Fettblatt Erba unta comune *Pinguicula vulgaris*

Ufer, Feuchtgebiete

Pflanzenfamilie

Wasserschlauchgewächse

Blütezeit

Mai - Juli

Grösse

5 - 20 cm



Das Gemeine Fettblatt ist die in der Schweiz am meisten verbreitete Fettblattart. Sie wächst vom Tiefland bis in hochalpine Lagen.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





© Josef Hartmann

Sommer-Wendelähre **Viticcini estivi** ***Spiranthes aestivalis***

Ufer, Feuchtgebiete

Pflanzenfamilie
Orchideengewächse

Blütezeit
Juli - August

Grösse
10 - 30 cm



Diese Art ähnelt der nahe verwandten Herbst-Wendelähre. Sie blüht jedoch früher, bevorzugt nasse Standorte und ist in Graubünden seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr nachgewiesen worden.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Zwerg-Rohrkolben *Lisca minore* *Typha minima*

Ufer, Feuchtgebiete

Pflanzenfamilie


Rohrkolbengewächse

Blütezeit

Mai - Juni

Grösse

30 - 80 cm



Der kleinste bei uns heimische Rohrkolben ist in der ganzen Schweiz vom Aussterben bedroht. Die natürliche Flussaue der Ruinaulta beherbergt noch wenige Vorkommen dieser ehemals weit verbreiteten Art.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Silber-Rohrkolben

Lisca di Shuttleworth

Typha shuttleworthii

Ufer, Feuchtgebiete

Pflanzenfamilie


Rohrkolbengewächse

Blütezeit

Juni - August

Grösse

100 - 200 cm



Markenzeichen aller Rohrkolbenarten ist der zweiteilige Kolben: Der untere, walzenförmige, braune Teil besteht nur aus weiblichen Blüten. Im oberen, bei dieser Art kaum abgesetzten Teil befinden sich die männlichen Blüten. Diese Art wächst an langsam fliessenden oder stehenden, kühlen Gewässern.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Alpen-Mannsschild **Androsace dei ghiacciai** **Androsace alpina**

Fels, Schutt, Geröll

Pflanzenfamilie


Schlüsselblumengewächse

Blütezeit

Juli - August

Grösse

1 - 5 cm



Diese Art bildet flache Polster mit fast sitzenden Blüten. Sie kommt oberhalb der Waldgrenze bis über 4000 m ü. M. auf kalkarmem Gestein vor und ist in weiten Teilen Graubündens vorhanden.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Schweizer Mannsschild ***Androsace emisferica*** ***Androsace helvetica***

Fels, Schutt, Geröll

Pflanzenfamilie


Schlüsselblumengewächse

Blütezeit

Mai - Juli

Grösse

1 - 3 cm



Alle Mannsschildarten sind mit den Schlüsselblumen verwandt. Diese Art bildet dichte, graugrüne Polster und lange Pfahlwurzeln, mit denen sie sich in alpinen Kalkfelsspalten verankert und so an Nährstoffe und Wasser gelangt.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Vandellis Mannsschild **Androsace di Vandelli** **Androsace vandellii**

Fels, Schutt, Geröll

Pflanzenfamilie


Schlüsselblumengewächse

Blütezeit

Juli

Grösse

1–3 cm



Alle Mannsschildarten sind mit den Schlüsselblumen verwandt. Diese Art ist dem Schweizer Mannschild sehr ähnlich. Die Polster sind jedoch nicht graugrün, sondern weissfilzig und wachsen auf Silikatgestein.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Ährige Edelraute

Assenzio genepì a spiga


Artemisia genipi

Fels, Schutt, Geröll

Pflanzenfamilie
Korbblütler

Blütezeit
Juli - August

Grösse
10 - 20 cm



Aus der aromatischen, graufilzigen Pflanze wird der Likör Génépi hergestellt. Zu diesem Zweck wird die geschützte Art heute angebaut und darf nicht mehr in der Natur gesammelt werden.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Echte Edelraute Assenzio genepì bianco *Artemisia umbelliformis*


Fels, Schutt, Geröll

Wiesen, Weiden

Pflanzenfamilie
Korbblütler

Blütezeit
Juli - August

Grösse
10 - 20 cm



Die Echte Edelraute ist der Ährigen Edelraute sehr ähnlich. Auch sie wird zur Herstellung von Likör angebaut und darf wie alle geschützten Arten nicht mehr in der Natur gesammelt werden.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Himmelsherold **Eritrichio nano** ***Eritrichium nanum***

Fels, Schutt, Geröll

Pflanzenfamilie


Borretschgewächse

Blütezeit

Juli - August

Grösse

2 - 5 cm



Diese mit dem Vergissmeinnicht verwandte Pflanze zeichnet sich durch ihre silbrig behaarten Blätter und ihren intensiven blumig-seifigen Duft aus. Sie wächst fast nur oberhalb von 2500 m ü. M.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





© Urban Augelehrn

Aurikel

Primula orecchia d'orso

Primula auricula

Fels, Schutt, Geröll

Wiesen, Weiden

Pflanzenfamilie


Schlüsselblumengewächse

Blütezeit

Mai - Juni

Grösse

5 - 20 cm



Die Aurikel besitzt als Anpassung an den felsigen Standort fleischige, wasserspeichernde Blätter. Eine Wachsschicht schützt zusätzlich vor Verdunstung und Sonneneinstrahlung.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Kärntner Saumnarbe

Genzianella di Carinzia

Lomatogonium carinthiacum

Fels, Schutt, Geröll

Wiesen, Weiden

Pflanzenfamilie


Enziangewächse

Blütezeit

August

Grösse

2 – 12 cm



Die Art ist in der Schweiz stark gefährdet und kommt nur noch in Graubünden vor. Dort erreicht sie ihre westliche Verbreitungsgrenze. Als einjährige Art ist sie auf lückige Vegetation auf Schwemmböden von Gletscherbächen und in Gebirgsweiden angewiesen. Ihre Samen keimen nur bei günstigen Bedingungen, so dass die Pflanze nicht jedes Jahr zu finden ist.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Spitzorchis Orchide *Anacamptis pyramidalis*

Wiesen, Weiden

Gebüsche,
Hochstaudenfluren,
Krautsäume

Pflanzenfamilie
Orchideengewächse

Blütezeit
Mai – Juli

Grösse
20 – 60 cm



Die Spitzorchis verdankt ihren Namen ihrem beim Aufblühen spitz zulaufenden Blütenstand. Deshalb wird sie auch Pyramidenorchis genannt. Sie hat einen bis 15 mm langen Sporn und wird nur von langrüssigen Tagfaltern bestäubt.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Bewimperter Mannsschild

Androsace prostrata

Androsace chamaejasme

Wiesen, Weiden

Pflanzenfamilie


Schlüsselblumengewächse

Blütezeit

Juni - Juli

Grösse

2 - 10 cm



Charakteristisch für diese auf Kalk wachsende Art ist der langhaarig-zottige Stängel. Sie ist in Graubünden weit verbreitet und kommt auch weltweit in vielen Gebirgen der Nordhalbkugel vor.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Stumpfblättriger Mannsschild **Androsace gelsomino** **Androsace obtusifolia**

Wiesen, Weiden

Pflanzenfamilie


Schlüsselblumengewächse

Blütezeit

Juli - August

Grösse

5 - 10 cm



Alle Mannsschildarten sind mit den Schlüsselblumen verwandt. Diese Art ist dem Bewimperten Mannsschild sehr ähnlich. Sie meidet jedoch kalkhaltige Böden und ihr Stängel ist weniger stark behaart.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Astlose Graslilie **Lilioasfodelo maggiore** ***Anthericum liliago***

Wiesen, Weiden


**Gebüsche,
Hochstaudenfluren,
Krautsäume**

Wälder

Pflanzenfamilie
Spargelgewächse

Blütezeit
Mai – Juni

Grösse
30 – 60 cm



Die Graslilie verdankt ihren Namen den grasartigen Blättern und den lilienähnlichen Blüten. Sie mutet nicht nur mediterran an, sondern bevorzugt auch trockene Standorte, insbesondere Trockenrasen, warme Felshänge und lichte Wälder.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Alpen-Grasnelke Spillone alpino *Armeria alpina*

Wiesen, Weiden

Fels, Schutt, Geröll

Pflanzenfamilie


Bleiwurzgewächse

Blütezeit

Juli - August

Grösse

5 - 20 cm



Charakteristisch für diese Pflanze sind die grasartigen Blätter und die rosa-farbenen Blüten, die kopfartig am Ende eines blattlosen Stängels angeordnet sind. Die Schweiz liegt an der Verbreitungsgrenze dieser Art, die vor allem in den Pyrenäen und in den Süd- und Westalpen vorkommt.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Lanzettliche Mondraute

Botrichio lanceolato

Botrychium lanceolatum

Wiesen, Weiden

Pflanzenfamilie

Natternzungengewächse

Blütezeit

Juli - August

Grösse

5 - 15 cm



Diese Farnpflanze ist in der Schweiz vom Aussterben bedroht.

Sie kommt fast nur in Graubünden vor, aber nur an sehr wenigen Stellen.

Ihre Hauptverbreitung liegt im nördlichen Russland, in Skandinavien, Island, Grönland und in den USA.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Ästige Mondraute

Botrichio ramoso

Botrychium matricariifolium

Wiesen, Weiden

Wälder

Pflanzenfamilie

Natternzungengewächse

Blütezeit

Juni - Juli

Grösse

10 - 20 cm



Die Ästige Mondraute wächst vom Tiefland bis etwa zur Waldgrenze auf eher sauren Magerweiden und Mähwiesen, am Rand von Heiden und in lichten Nadelwäldern. Sie ist vom Aussterben bedroht und wächst in Graubünden nur vereinzelt im Puschlav, im Val Calanca und in der Surselva.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





© Josef Hartmann

Straussblütige Glockenblume

Campanula gialla

Campanula thrysoides

Wiesen, Weiden

Pflanzenfamilie


Glockenblumengewächse

Blütezeit

Juni - Juli

Grösse

10 - 50 cm



Die einzige gelbblühende Glockenblumenart der Schweiz bildet zuerst eine Blattrosette. Der Blühbeginn hängt von der Grösse der Rosette ab und kann je nach Standort nach 2 bis 16 Jahren einsetzen.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung






Zwergorchis Gramignola alpina Chamorchis alpina

Wiesen, Weiden

Pflanzenfamilie
Orchideengewächse

Blütezeit
Juli - August

Grösse
5 - 15 cm



Die kleinste Orchidee der Schweiz wächst oft zusammen mit dem Edelweiss, da beide kalkreiche, steinige Rasen über der Waldgrenze bevorzugen. Ihre schmalen Laubblätter wirken wie dichte Grasbüschel.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Grüne Hohlzunge

Celoglosso

Coeloglossum viride

Wiesen, Weiden

Gebüsche,
Hochstaudenfluren,
Krautsäume

Pflanzenfamilie
Orchideengewächse

Blütezeit
Mai - Juli

Grösse
5 - 20 cm



Diese unscheinbare Orchidee ist bei genauerem Hinsehen auf Bergwiesen und Weiden verbreitet anzutreffen. Von der ähnlichen Zwerghorchis unterscheidet sie sich unter anderem durch die breiteren Blätter.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Holunder-Fingerwurz

Orchidee sambucina

Dactylorhiza sambucina

Wiesen, Weiden

**Gebüsche,
Hochstaudenfluren,
Krautsäume**

Pflanzenfamilie


Orchideengewächse

Blütezeit

April - Juni

Grösse

10 - 30 cm



Die Holunder-Fingerwurz ist die einzige Fingerwurzart, die sowohl gelb- als auch rotblühende Farbvarianten hat. Diese kommen oft nebeneinander vor. Sie wächst im Kanton Graubünden fast nur in den Südtälern und bevorzugt kalkarme Magerrasen und Krautsäume.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Pracht-Nelke Garofano a pennacchio *Dianthus superbus*

Wiesen, Weiden

Gebüsche,
Hochstaudenfluren,
Krautsäume

Pflanzenfamilie


Nelkengewächse

Blütezeit

Juni - September

Grösse

30 - 60 cm



Diese Nelkenart ist durch ihre fransig zerschlitzten Blütenblätter unverwechselbar. Wegen der sehr langen Kronröhre kommen als Bestäuber nur Insekten mit langem Saugrüssel wie Tagfalter oder tagaktive Schwärmer in Frage. Sie wächst in mageren Wiesen und Weiden und Zwergstrauchheiden.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Berg-Drachenkopf

Melissa di Ruysch

Dracocephalum ruyschiana


Wiesen, Weiden

Gebüsche,
Hochstaudenfluren,
Krautsäume

Pflanzenfamilie
Lippenblütler

Blütezeit
Juli - August

Grösse
10 - 30 cm



Die blauvioletten Blüten erinnern an Drachenköpfe mit aufgerissenem Maul, daher der Name. Die Art ist in der Schweiz nur punktuell in Bergwiesen, Wildheuplanken und Krautsäumen verbreitet. In Graubünden kommt sie vor allem im Engadin und in Samnaun vor.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Langspornige Handwurz

Manina rosea

Gymnadenia conopsea

Wiesen, Weiden

Wälder

Pflanzenfamilie

Orchideengewächse


Blütezeit

Mai - August

Grösse

20 - 50 cm

Die Langspornige Handwurz zeichnet sich durch einen sehr langen, dünnen Sporn an jeder Blüte aus. Dadurch ist der Nektar nur für langrüsslige Schmetterlinge erreichbar. Sie gedeiht in verschiedenen Lebensräumen, solange diese nährstoffarm sind.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Wohlriechende Handwurz

Manina profumata

Gymnadenia odoratissima

Wiesen, Weiden

Wälder

Ufer,
Feuchtgebiete

Pflanzenfamilie


Orchideengewächse

Blütezeit

Juni - August

Grösse

10 - 30 cm



Diese Handwurzart unterscheidet sich von der ähnlichen Langspornigen Handwurz durch den kürzeren Sporn und die stark nach Vanille duftenden Blüten. Die beiden Arten bastardieren auch miteinander. Diese Art kommt vorwiegend in lichten Föhrenwäldern, auf Kalkgeröll und in Moorwiesen vor.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Einorchis Orchide ad un bulbo *Herminium monorchis*

Wiesen, Weiden

Ufer, Feuchtgebiete

Pflanzenfamilie


Orchideengewächse

Blütezeit

Mai - Juli

Grösse

10 - 25 cm



Die grünlich-gelben Blüten dieser Orchidee duften intensiv nach Honig, weshalb die Pflanze auch Honigorchis genannt wird. Sie wächst bevorzugt in nährstoffarmen, feuchten Wiesen und kalkreichen Magerrasen.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Edelweiss

Edelweiss

Leontopodium alpinum


Wiesen, Weiden

**Fels, Schutt,
Geröll**

Pflanzenfamilie
Korbblütler

Blütezeit
Juli - September

Grösse
3 – 20 cm



Das Wahrzeichen unserer Alpen stammt von verwandten Arten aus den Kältesteppen des Himalaya ab, von wo es nach der letzten Eiszeit eingewandert ist. Es wächst meist auf Kalk in steinigen Rasen und an Felsbändern.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Weisse Garten-Narzisse

Narciso selvatico

Narcissus poëticus

Wiesen, Weiden

Pflanzenfamilie


Narzissengewächse

Blütezeit

April - Mai

Grösse

20 - 40 cm



Die Weisse Gartennarzisse stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum, wurde aber auf der Alpensüdseite schon vor dem 16. Jahrhundert in der Schweiz heimisch. Als beliebte Gartenpflanze ist sie zudem vielerorts ausgewildert.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Osterlocke

Narciso trombone

Narcissus pseudonarcissus

Wiesen, Weiden

Wälder

Pflanzenfamilie


Narzissengewächse

Blütezeit

März - April

Grösse

15 - 40 cm



Osterlocken gehören seit jeher zur heimischen Flora. Sie wachsen in Bergwiesen und -weiden, Obstgärten und lichten Waldstellen. Heute sind jedoch oft verwilderte Gartenformen mit grösseren Blüten anzutreffen.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Schwarzes Männertreu

Nigritella comune

Nigritella rhellicani

Wiesen, Weiden

Pflanzenfamilie

Orchideengewächse

Blütezeit

Juni - August

Grösse

5 - 25 cm



Charakteristisch für diese Orchideenart sind die dunkelrotbraunen Blüten, die stark nach Vanille duften. Damit lockt sie Insekten zur Bestäubung an. Sie ist auf Wiesen und Magerrasen in allen Teilen der Schweizer Alpen und auch im Jura regelmässig anzutreffen.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Rotes Männertreu

Nigritella rossa


Nigritella rubra

Wiesen, Weiden

Pflanzenfamilie
Orchideengewächse

Blütezeit
Juni - Juli

Grösse
10 - 25 cm



Die Blüten dieser Männertreu-Art sind hellrot und die Lippe ist am Grund stark eingerollt. Sie ist viel seltener als die ähnliche Schwarze Männertreu. Ihr Hauptverbreitungsgebiet liegt im Osten der Schweiz, vor allem in Graubünden.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Fliegen-Ragwurz *Ophride insectifera* *Ophrys insectifera*


Wiesen, Weiden

Wälder

Pflanzenfamilie
Orchideengewächse

Blütezeit
Mai - Juli

Grösse
15 - 40 cm



Zur Bestäubung imitiert die Fliegen-Ragwurz mit ihren Blütenblättern die Form bestimmter Wespen und lockt diese zusätzlich mit weiblichen Sexualhormonen an. Beim Paarungsversuch übertragen die Männchen den Pollen auf die Blüten.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Knabenkräuter

Die Knabenkräuter bilden als Überdauerungsorgane im Boden zwei eiförmige, hodenähnliche Knollen, daher der Name (griech. orchis = Hoden). Wie bei den Fingerwurzen haben sich auch Knabenkräuter und ihre Bestäuber im Verlauf der Evolution wechselseitig beeinflusst. Dabei haben sich zum Teil hochspezialisierte Bestäubungsmechanismen zwischen Blüte und Insekt entwickelt.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Wanzen-Knabenkraut

Orchide cimicina

Orchis coriophora

Wiesen, Weiden

**Gebüsche,
Hochstaudenfluren,
Krautsäume**

Pflanzenfamilie


Orchideengewächse

Blütezeit

Mai - Juli

Grösse

10 - 40 cm



Diese stark gefährdete Art kommt in Graubünden fast nur noch in sonnigen Magerwiesen und Krautsäumen der Surselva vor. Im Misox und im Bergell ist sie seit über 25 Jahren verschwunden. Ihre Blüten riechen nach Blattwanzen.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Männliches Knabenkraut

Orchide maschia

Orchis mascula

Wiesen, Weiden

Wälder

Gebüsche,
Hochstaudenfluren,
Krautsäume

Pflanzenfamilie


Orchideengewächse

Blütezeit

April - Juli

Grösse

10 - 60 cm



Das Männliche Knabenkraut ist von kräftigem Wuchs und in ganz Graubünden verbreitet. Es wächst auf mageren, kalkhaltigen Wiesen und Weiden sowie in Gebüschen und lichten Wäldern, vom Tiefland bis oberhalb der Waldgrenze.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Helm-Knabenkraut

Orchide militare

Orchis militaris

Wiesen, Weiden

Wälder

**Gebüsche,
Hochstaudenfluren,
Krautsäume**

Pflanzenfamilie


Orchideengewächse

Blütezeit

Mai – Juni

Grösse

20 – 50 cm



Beim Helm-Knabenkraut formen sich die Kronblätter zu einem graurosa Helm. Seine Bestäuber sind vor allem Hummeln. Es ist in Magerwiesen, lichten Wäldern sowie trockenwarmen Krautsäumen und Gebüschen zu finden.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Kleines Knabenkraut **Orchide minore** ***Orchis morio***

Wiesen, Weiden

Pflanzenfamilie


Orchideengewächse

Blütezeit

April - Juni

Grösse

10 - 30 cm



Das Kleine Knabenkraut ist eine der ersten Pflanzen, die auf einer Magerwiese blühen. Als Nektartäuschblume täuscht es den Bestäubern durch Duft und Farbe eine Nektarquelle vor, obwohl keine vorhanden ist. Da Bienen und Hummeln rasch lernen, dass diese Blüten keine Belohnung bieten, ist es vorteilhaft früh zu blühen, wenn die Bestäuber noch unerfahren sind.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Dreizähniges Knabenkraut

Orchide screziata

Orchis tridentata

Wiesen, Weiden

**Gebüsche,
Hochstaudenfluren,
Krautsäume**

Pflanzenfamilie

Orchideengewächse

Blütezeit

April - Juni

Grösse

15 - 40 cm



Das Dreizähnige Knabenkraut kommt in der Schweiz bis auf eine Ausnahme in der Surselva nur im Misox und Tessin vor. Dort wächst es vor allem in trockenen Wiesen, Gebüschen und Krautsäumen.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Schwärzliches Knabenkraut **Orchide bruciacchiata** ***Orchis ustulata***

Wiesen, Weiden

Pflanzenfamilie


Orchideengewächse

Blütezeit

April - August

Grösse

10 - 40 cm



Die Blütenblätter des Schwärzlichen Knabenkrauts sind aussen dunkel-purpur bis schwarz gefärbt, weshalb die geschlossenen Blütenknospen wie angebrannt aussehen. Die Art wird deshalb bisweilen auch Brand-Knabenkraut genannt.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung






Weisse Trichterlilie Paradisia *Paradisea liliastrum*

Wiesen, Weiden

Pflanzenfamilie
Spargelgewächse

Blütezeit
Juni - Juli

Grösse
30 - 50 cm



Die auch Paradieslilie genannte Pflanze zeichnet sich durch grosse, trichterförmige Blüten aus, die alle nach einer Seite gerichtet sind. Sie wurde zu Ehren des italienischen Schriftstellers und Naturforschers Giovanni Paradisi benannt.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Weisszunge Orchidee *candida* *Pseudorchis albida*

Wiesen, Weiden

Gebüsche,
Hochstaudenfluren,
Krautsäume

Pflanzenfamilie
Orchideengewächse

Blütezeit
Juni - Juli

Grösse
10 - 30 cm



Diese hellgelb bis weiss blühende Pflanze ist eine typische Orchidee von Bergwiesen und -weiden. Sie wächst auch in Zwergstrauchheiden.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung






Herbst-Wendelähre **Viticcini autunnali** ***Spiranthes spiralis***

Wiesen, Weiden

Pflanzenfamilie
Orchideengewächse

Blütezeit
August - Oktober

Grösse
10 - 40 cm



Die Herbst-Wendelähre blüht erst nach der Mahd oder Beweidung ihrer Standorte und damit als letzte aller Orchideenarten der Schweiz. Der Name «Wendelähre» beschreibt ihren spirig gewundenen Blütenstand.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Kugelorchis Orchidee dei pascoli Traunsteinera globosa

Wiesen, Weiden

Pflanzenfamilie


Orchideengewächse

Blütezeit

Juni - August

Grösse

25 - 50 cm



Diese Orchidee hat viele rosafarbene Blüten, die beim Aufblühen im Blütenstand zuerst pyramidenförmig, später kugelig wirken – daher der Name Kugelorchis. Sie wächst gerne in feuchten Bergwiesen und an Wildheuplanken.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Alpen-Akelei

Aquilegia maggiore

Aquilegia alpina

Gebüsche, Hochstaudenfluren,
Krautsäume

Wiesen, Weiden

Wälder

Pflanzenfamilie


Hahnenfußgewächse

Blütezeit

Julii - September

Grösse

20 - 70 cm



Typisch für alle Akelei-Arten sind die zur Blüte gehörenden fünf gespornten Nektarblätter, die von langrüssigen Hummelarten besucht werden. Die Alpen-Akelei zeichnet sich durch ihre grossen, hellblauen bis blaulila-farbenen Blüten aus.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Hoher Rittersporn ***Speronella elevata*** ***Delphinium elatum***

Gebüsche, Hochstaudenfluren, Krautsäume

Pflanzenfamilie


Hahnenfußgewächse

Blütezeit

Juli - August

Grösse

60 - 150 cm



Dank ihren langen, reichblütigen Blütentrauben aus stahlblauen, langspornigen Blüten ist die Art seit dem Mittelalter eine beliebte Zierpflanze. Die Pflanze ist für den Menschen sehr giftig. Sie ist eine typische Art der Hochstaudenfluren.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Alpen-Mannstreu

Calcatreppola alpina

Eryngium alpinum

Gebüsche, Hochstaudenfluren,
Krautsäume

Wiesen, Weiden

Pflanzenfamilie


Doldengewächse

Blütezeit

Juli - August

Grösse

30 - 70 cm



Die Alpen-Mannstreu, auch Blaudistel oder Alpendistel genannt, war vor rund 100 Jahren nur im Prättigau und im Rheinwald in wildwachsenden Populationen nachgewiesen. An vielen danach bekannt gewordenen Fundorten ist sie angepflanzt worden oder aus Gärten verwildert.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





© Josef Hartmann

Feuerlilie Giglio rosso *Lilium bulbiferum*

Gebüsche, Hochstaudenfluren,
Krautsäume

Wiesen, Weiden

Pflanzenfamilie


Liliengewächse

Blütezeit

Juni - Juli

Grösse

20 - 80 cm



Die leuchtend orangeroten Blüten und die zahlreichen Stängelblätter machen diese Lilienart unverwechselbar und geben ihr auch den Namen. Sie kommt zwar in den meisten Teilen Graubündens vor, ist aber überall selten.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Türkenbund Giglio martagone *Lilium martagon*

Gebüsche, Hochstaudenfluren,
Krautsäume

Wälder

Pflanzenfamilie

Liliengewächse

Blütezeit

Juni - Juli

Grösse

30 - 90 cm



Der Name stammt wohl vom türkischen Wort «tülbent» (Turban) ab, da die Blütenblätter turbanähnlich nach hinten geschlagen sind. Sie wächst meist auf kalkhaltigen Böden und kommt in weiten Teilen Graubündens vor.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Blasses Knabenkraut

Orchide *pallida*

Orchis pallens

**Gebüsche, Hochstaudenfluren,
Krautsäume**

Wälder

Pflanzenfamilie
Orchideengewächse

Blütezeit
April - Juni

Grösse
10 - 30 cm



Die Blätter dieser gelb blühenden Art treiben bereits im Herbst aus, weshalb sie warme Standorte wie lichte Wälder, Gebüsche und Krautsäume in wintermilden Lagen bevorzugt.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Virginische Mondraute ***Botrichio virginiano*** ***Botrychium virginianum***

Wälder

Wiesen, Weiden

Pflanzenfamilie

Natternzungengewächse

Blütezeit

Juli - August

Grösse

15 – 30 cm



Die Virginische Mondraute ist in der Schweiz vom Aussterben bedroht.

Sie kommt nur noch an wenigen Stellen vor, unter anderem in der Ruinaulta.

Sie bevorzugt feuchte Wälder und schattige Waldwiesen.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





© Andreas Gyssax

Weisses Waldvögelein *Cefalantera bianca* *Cephalanthera damasonium*

Wälder

**Gebüsche,
Hochstaudenfluren,
Krautsäume**

Pflanzenfamilie

Orchideengewächse

Blütezeit

Mai - Juni

Grösse

20 - 50 cm



Diese Orchideenart ist durch weisse Blüten und relativ breite, flache Blätter gekennzeichnet. Sie bestäubt sich selbst, indem der Pollen direkt auf die klebrige Narbe fällt. So sind die Blüten nicht auf Insektenbesuch angewiesen und öffnen sich daher oft kaum.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Langblättriges Waldvögelein

Cefalantera maggiore

Cephalanthera longifolia

Wälder

**Gebüsche,
Hochstaudenfluren,
Krautsäume**

Pflanzenfamilie


Orchideengewächse

Blütezeit

April - Juni

Grösse

20 - 50 cm



Charakteristisch für diese weissblühende Orchidee sind die relativ schmalen, gefalteten Blätter. Die Oberseite der Lippe (mittleres Blütenblatt) ist mit einem gelben, pollenhähnlichen Pulver überzogen, das Insekten zur Bestäubung anlockt.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Rotes Waldvögelein **Cefalantera rossa** **Cephalanthera rubra**


Wälder

**Gebüsche,
Hochstaudenfluren,
Krautsäume**

Pflanzenfamilie
Orchideengewächse

Blütezeit
Mai - Juli

Grösse
20 - 50 cm



Von den drei Waldvögelein-Arten der Schweiz ist sie die einzige, die rot blüht. Sie ist auch diejenige, die am höchsten in die Bündner Alpen vordringt und auch im Engadin wächst. Die geschlossenen Blüten ähneln einem Vogelkopf, deshalb der deutsche Name «Waldvögelein».



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Korallenwurz

Corallorrhiza

Corallorrhiza trifida

Wälder

Pflanzenfamilie


Orchideengewächse

Blütezeit

Mai - Juli

Grösse

10 - 25 cm



Diese blattgrünlose Orchidee kommt vorwiegend in schattigen, moosigen Fichten- und Föhrenwäldern vor. Ihr Wurzelstock ist korallenartig verzweigt. Die Korallenwurz lebt mit einem Pilz, dem sie alle notwendigen Nährstoffe abzapft.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Europäisches Alpenveilchen Ciclamino delle Alpi *Cyclamen purpurascens*

Wälder

Pflanzenfamilie

Schlüsselblumengewächse

Blütezeit

Juni - Oktober

Grösse

5 - 15 cm



Mit ihren zurückgeschlagenen Blütenblättern und den nieren- bis herzförmigen Blättern ist diese Pflanze unverkennbar. Sie ist nahe verwandt mit dem als Zimmerpflanze beliebten Persischen Alpenveilchen (*Cyclamen persicum*).



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Frauenschuh

Pianelle della Madonna

Cypripedium calceolus


Wälder

Gebüsche,
Hochstaudenfluren,
Krautsäume

Pflanzenfamilie
Orchideengewächse

Blütezeit
Mai – Juli

Grösse
15 – 50 cm



Die Blüten des Frauenschuhs sind die grössten Einzelblüten unter den europäischen Orchideen. Mit ihren einzigartig geformten, gelben Blütenblättern ähneln sie mit etwas Fantasie einem Frauenschuh. Die Art ist sowohl durch zu intensive Forstwirtschaft als auch durch illegales Ausgraben gefährdet.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Echter Seidelbast

Dafne mezereo

Daphne mezereum

Wälder

Fels, Schutt,
Geröll

Gebüsche,
Hochstaudenfluren,
Krautsäume

Pflanzenfamilie


Seidelbastgewächse

Blütezeit

Februar - April (Juli)

Grösse

25 - 120 cm



Die herrlich duftenden Blüten erscheinen noch vor den Blättern, oft schon im Februar. Charakteristisch sind auch die leuchtend roten Beeren. Die Pflanze ist für den Menschen sehr giftig.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung



Stendelwurzen



Diese Orchideengattung ist einer relativ starken evolutiven Veränderung unterworfen. Es gibt mehrere Arten, die sich selbst bestäuben und sich zum Teil sehr ähnlich sind.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Braunrote Stendelwurz *Elleborine violacea* *Epipactis atrorubens*

Wälder

Fels, Schutt,
Geröll

Gebüsche,
Hochstaudenfluren,
Krautsäume

Pflanzenfamilie


Orchideengewächse

Blütezeit

Juni - August

Grösse

20 - 80 cm



Die Braunrote Stendelwurz wächst bevorzugt in kalkreichen, trockenwarmen Wäldern und Gebüschen oder auf Felsschutt. Sie zeichnet sich durch ihre dunkelpurpurroten Blütenblätter aus und duftet besonders bei warmem Wetter intensiv nach Vanille.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Entferntblättrige Stendelwurz *Elleborina a foglie distanti* *Epipactis distans*

Wälder

Gebüsche, Hochstaudenfluren,
Krautsäume

Pflanzenfamilie


Orchideengewächse

Blütezeit

Juni - Juli

Grösse

25 - 60 cm



Die Entferntblättrige Stendelwurz ist hauptsächlich in Graubünden und im Wallis verbreitet, aber überall selten. Sie wächst vor allem in Föhrenwäldern und Magerwiesen.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Gewöhnliche Breitblättrige Stendelwurz

Elleborine comune

Epipactis helleborine

Wälder

Gebüsche, Hochstaudenfluren,
Krautsäume

Pflanzenfamilie


Orchideengewächse

Blütezeit

Juli - August

Grösse

20 - 110 cm



Bei der Gewöhnlichen Breitblättrigen Stendelwurz variiert die Blütenfarbe von fast weiss bis dunkelviolet. Sie ist in der Schweiz weit verbreitet.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Müllers Breitblättrige Stendelwurz

Epipactis muelleri

Wälder

Gebüsche, Hochstaudenfluren,
Krautsäume

Pflanzenfamilie

Orchideengewächse

Blütezeit

Juli - August

Grösse

20 - 90 cm



Müllers Breitblättrige Stendelwurz kommt in den Alpen nur an wenigen Stellen vor. Sie bevorzugt lichte Wälder, Magerwiesen und Krautsäume.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung






Widerbart Epipogio *Epipogium aphyllum*

Wälder

Pflanzenfamilie
Orchideengewächse

Blütezeit
Juli - August

Grösse
5 - 20 cm



Diese zerbrechlich wirkende Orchidee besitzt weder Blätter noch Chlorophyll. Sie parasitiert auf einem Wurzelpilz, von dem sie alle lebenswichtigen Nährstoffe bezieht. Sie blüht nur unregelmässig und kann dazwischen jahrelang unterirdisch überdauern.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung






Moosorchis Godyera *Goodyera repens*

Wälder

Pflanzenfamilie
Orchideengewächse

Blütezeit
Juni - August

Grösse
10 - 25 cm



Die Moosorchis ist die einzige immergrüne Orchidee der Schweiz. Einzigartig für einheimische Orchideen sind auch ihre netzartigen Blattadern. Wie ihr Name schon sagt, wächst sie in moosreichen Föhren- und Fichtenwäldern.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





© Marylaure de la Harpe

Dingel Fior di legna *Limodorum abortivum*

Wälder

Gebüsche,
Hochstaudenfluren,
Krautsäume

Pflanzenfamilie


Orchideengewächse

Blütezeit

Mai – Juni

Grösse

20 – 60 cm



Mit ihrem fingerdicken, oft kerzengerade aus dem Boden ragenden Stängel und den schuppenförmigen Blättern erinnert diese Orchidee auf den ersten Blick an eine violette Spargel. Um sich mit Nährstoffen zu versorgen, zapft sie mit ihren Wurzeln ausgewählte Pilze im Boden an.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Kleines Zweiblatt

Listera minore


Listera cordata

Wälder

Pflanzenfamilie
Orchideengewächse

Blütezeit
Juni - Juli

Grösse
5 - 20 cm



Diese unscheinbare Fichtenwaldorchidee wird wegen ihrer geringen Grösse oft übersehen. Sie ist sehr empfindlich gegen Austrocknung und wächst daher bevorzugt an nordexponierten Steilhängen oder in Mulden.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Grosses Zweiblatt *Listera maggiore* *Listera ovata*


Wälder

Wiesen, Weiden

Pflanzenfamilie
Orchideengewächse

Blütezeit
Mai - Juli

Grösse
20 - 50 cm



Charakteristisch für diese weit verbreitete Orchidee sind die zwei breiten, derben Blätter, die sich nahe der Bodenoberfläche gegenüberstehen, sowie die grünen Blüten. Sie bevorzugt eher feuchte Wiesen, Weiden und Wälder.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Einblatt Microstile *Malaxis monophyllos*

Wälder

Ufer,
Feuchtgebiete

Wiesen, Weiden

Pflanzenfamilie


Orchideengewächse

Blütezeit

Juni - Juli

Grösse

10 - 30 cm



Wie der Name schon sagt, hat diese Orchidee meist nur ein Blatt. Charakteristisch sind auch die zahlreichen, sehr kleinen, gelblich-grünen Blüten. Sie wächst in Auenwäldern, feuchten Waldwiesen und Mooren.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Nestwurz

Nido d'uccello

Neottia nidus-avis

Wälder

Pflanzenfamilie


Orchideengewächse

Blütezeit

Mai - Juli

Grösse

20 - 40 cm



Die Nestwurz enthält kein Chlorophyll und ist daher vollständig von einem Pilz als Nahrungspartner abhängig. Ihren Namen verdankt die Orchidee dem nestartig verflochtenen Wurzelstock.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Weisses Breitkölbchen

Platantera comune

Platanthera bifolia

Wälder

Wiesen, Weiden

Gebüsche,
Hochstaudenfluren,
Krautsäume

Pflanzenfamilie


Orchideengewächse

Blütezeit

Mai - Juli

Grösse

20 - 50 cm



Diese in der ganzen Schweiz verbreitete Orchidee zeichnet sich durch ihre weissen Blüten aus, die nachts duften. Damit lockt sie Nachtfalter an, die mit ihrem Rüssel Nektar saugen und so die Blüten bestäuben.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Grünliches Breitkölbchen

Platantera verdastra

Platanthera chlorantha

Wälder

Wiesen, Weiden

Gebüsche,
Hochstaudenfluren,
Krautsäume

Pflanzenfamilie


Orchideengewächse

Blütezeit

Mai - Juli

Grösse

20 - 50 cm



Diese Art ähnelt dem Weissen Breitkölbchen und bildet mit ihm auch Bastarde. Ihre Blüten sind grünlich-weiß und duften kaum. Sie ist schweizweit und auch in Graubünden etwas weniger verbreitet.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Hirschzunge

Scolopendria comune

Phyllitis scolopendrium

Wälder

**Fels, Schutt,
Geröll**

Pflanzenfamilie

Streifenfarngewächse

Blütezeit

Juni - August

Grösse

15 - 60 cm



Mit seinen hirschzungenartigen Blättern und den wurmförmigen Sporenbekältern auf der Blattunterseite ist dieser Farn unverwechselbar.

Seine Hauptverbreitung liegt im Jura und in den Nordalpen. In Graubünden wächst er nur an wenigen Stellen.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung





Brauns Schildfarn

Felce di Braun

Polystichum braunii

Wälder

Pflanzenfamilie


Wurmfarngewächse

Blütezeit

Julii - September

Grösse

30 - 70 cm



Diese Farnart ist in der Schweiz hauptsächlich im Tessin und den Bündner Südtälern verbreitet. Der Name «Braun» beschreibt nicht das Aussehen der Pflanze, sondern wurde zu Ehren des deutschen Botanikprofessors Alexander Braun verliehen.



Weitere Informationen unter
www.anu.gr.ch/artenfoerderung



Index



Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Italienischer Name	Seite
Ährige Edelraute	<i>Artemisia genipi</i>	Assenzio genepì a spiga	40
Alpen-Akelei	<i>Aquilegia alpina</i>	Aquilegia maggiore	78
Alpen-Fettblatt	<i>Pinguicula alpina</i>	Erba unta bianca	31
Alpen-Grasnelke	<i>Armeria alpina</i>	Spillone alpino	49
Alpen-Mannsschild	<i>Androsace alpina</i>	Androsace dei ghiacciai	37
Alpen-Mannstreu	<i>Eryngium alpinum</i>	Calcatreppola alpina	80
Ästige Mondraute	<i>Botrychium matricariifolium</i>	Botrichio ramoso	51
Astlose Graslilie	<i>Anthericum liliago</i>	Lilioasfodelo maggiore	48
Aurikel	<i>Primula auricula</i>	Primula orecchia d'orsa	43
Berg-Drachenkopf	<i>Dracocephalum ruyschiana</i>	Melissa di Ruysch	57
Bewimperter Mannsschild	<i>Androsace chamaejasme</i>	Androsace prostrata	46
Blasses Knabenkraut	<i>Orchis pallens</i>	Orchide pallida	83
Blutrote Fingerwurz	<i>Dactylorhiza cruenta</i>	Orchide sanguigna	12
Braunrote Stendelwurz	<i>Epipactis atrorubens</i>	Elleborine violacea	93
Brauns Schildfarn	<i>Polystichum braunii</i>	Felce di Braun	107
Breitblättrige Fingerwurz	<i>Dactylorhiza majalis</i>	Orchide a foglie larghe	16
Breitblättriges Wollgras	<i>Eriophorum latifolium</i>	Pennacchi a foglie larghe	24
Dingel	<i>Limodorum abortivum</i>	Fior di legna	99
Dreizähniges Knabenkraut	<i>Orchis tridentata</i>	Orchide screziata	72
Dünnsporiges Fettblatt	<i>Pinguicula leptoceras</i>	Erba unta bianco-maculata	32
Echte Edelraute	<i>Artemisia umbelliformis</i>	Assenzio genepì bianco	41
Echter Seidelbast	<i>Daphne mezereum</i>	Dafne mezereo	91
Edelweiss	<i>Leontopodium alpinum</i>	Edelweiss	61
Einblatt	<i>Malaxis monophyllos</i>	Microstile	102
Einorchis	<i>Herminium monorchis</i>	Orchide ad un bulbo	60
Entferntblättrige Stendelwurz	<i>Epipactis distans</i>	Elleborina a foglie distanti	94
Europäisches Alpenveilchen	<i>Cyclamen purpurascens</i>	Ciclamino delle Alpi	89



Index



Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Italienischer Name	Seite
Feuerlilie	<i>Lilium bulbiferum</i>	Giglio rosso	81
Fieberklee	<i>Menyanthes trifoliata</i>	Trifoglio fibrino	29
Fleischrote Fingerwurz	<i>Dactylorhiza incarnata</i>	Orchide palmata	13
Fliegen-Ragwurz	<i>Ophrys insectifera</i>	Ofride insettifera	66
Frauenschuh	<i>Cypripedium calceolus</i>	Pianelle della Madonna	90
Gefleckte Fingerwurz	<i>Dactylorhiza maculata</i>	Orchide macchiata	15
Gelbe Schwertlilie	<i>Iris pseudacorus</i>	Giaggiolo acquatico	28
Gemeines Fettblatt	<i>Pinguicula vulgaris</i>	Erba unta comune	33
Gewöhnliche Breitblättrige Stendelwurz	<i>Epipactis helleborine</i>	Elleborine comune	95
Grosses Zweiblatt	<i>Listera ovata</i>	Listera maggiore	101
Grüne Hohlzunge	<i>Coeloglossum viride</i>	Celoglosso	54
Grünliches Breitkölbchen	<i>Platanthera chlorantha</i>	Platantera verdastra	105
Helm-Knabenkraut	<i>Orchis militaris</i>	Orchide militare	70
Herbst-Wendelähre	<i>Spiranthes spiralis</i>	Viticcini autunnali	76
Himmelsherold	<i>Eritrichium nanum</i>	Eritrichio nano	42
Hirschzunge	<i>Phyllitis scolopendrium</i>	Scolopendria comune	106
Hoher Rittersporn	<i>Delphinium elatum</i>	Speronella elevata	79
Holunder-Fingerwurz	<i>Dactylorhiza sambucina</i>	Orchide sambucina	55
Kärntner Saumnarbe	<i>Lomatogonium carinthiacum</i>	Genzianella di Carinzia	44
Kleines Knabenkraut	<i>Orchis morio</i>	Orchide minore	71
Kleines Zweiblatt	<i>Listera cordata</i>	Listera minore	100
Korallenwurz	<i>Corallorrhiza trifida</i>	Coralloriza	88
Kugelorchis	<i>Traunsteinera globosa</i>	Orchide dei pascoli	77
Langblättriger Sonnentau	<i>Drosera anglica</i>	Drosera a foglie allungate	18
Langblättriges Waldvögelein	<i>Cephalanthera longifolia</i>	Cefalantera maggiore	86
Langspornige Handwurz	<i>Gymnadenia conopsea</i>	Manina rosea	58
Lanzettliche Mondraute	<i>Botrychium lanceolatum</i>	Botrichio lanceolato	50



Index



Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Italienischer Name	Seite
Lappländische Fingerwurz	<i>Dactylorhiza lapponica</i>	Orchide della Lapponia	14
Männliches Knabenkraut	<i>Orchis mascula</i>	Orchide maschia	69
Moosorchis	<i>Goodyera repens</i>	Godyera	98
Müllers Breitblättrige Stendelwurz	<i>Epipactis muelleri</i>		96
Nestwurz	<i>Neottia nidus-avis</i>	Nido d'uccello	103
Osterglocke	<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	Narciso trombone	63
Pracht-Nelke	<i>Dianthus superbus</i>	Garofano a pennacchio	56
Rotes Männertreu	<i>Nigritella rubra</i>	Nigritella rossa	65
Rotes Waldvögelein	<i>Cephalanthera rubra</i>	Cefalantera rossa	87
Rundblättriger Sonnentau	<i>Drosera rotundifolia</i>	Drosera a foglie rotonde	19
Scheiden-Wollgras	<i>Eriophorum vaginatum</i>	Pennacchi guainati	26
Scheuchzers Wollgras	<i>Eriophorum scheuchzeri</i>	Pennacchi di Scheuchzer	25
Schmalblättriges Wollgras	<i>Eriophorum angustifolium</i>	Pennacchi a foglie strette	22
Schwalbenwurz-Enzian	<i>Gentiana asclepiadea</i>	Genziana asclepiade	27
Schwarzes Männertreu	<i>Nigritella rhellicani</i>	Nigritella comune	64
Schwärzliches Knabenkraut	<i>Orchis ustulata</i>	Orchide bruciacciata	73
Schweizer Mannsschild	<i>Androsace helvetica</i>	Androsace emisferica	38
Silber-Rohrkolben	<i>Typha shuttleworthii</i>	Lisca di Shuttleworth	36
Sommer-Wendelähre	<i>Spiranthes aestivalis</i>	Viticcini estivi	34
Spitzorchis	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Orchide	45
Straußblütige Glockenblume	<i>Campanula thyrsoides</i>	Campanula gialla	52
Stumpfblättriger Mannsschild	<i>Androsace obtusifolia</i>	Androsace gelsomino	47
Sumpf-Stendelwurz	<i>Epipactis palustris</i>	Elleborine palustre	20
Traunsteiners Fingerwurz	<i>Dactylorhiza traunsteineri</i>	Orchide di Traunsteiner	17
Türkenbund	<i>Lilium martagon</i>	Giglio martagone	82
Vandellis Mannsschild	<i>Androsace vandellii</i>	Androsace di Vandelli	39
Virginische Mondraute	<i>Botrychium virginianum</i>	Botrichio virginiano	84





Index

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Italienischer Name	Seite
Wanzen-Knabenkraut	<i>Orchis coriophora</i>	Orchide cimicina	68
Weisse Garten-Narzisse	<i>Narcissus poëticus</i>	Narciso selvatico	62
Weisse Trichterlilie	<i>Paradisea liliastrum</i>	Paradisia	74
Weisses Breitkölbchen	<i>Platanthera bifolia</i>	Platantera comune	104
Weisses Waldvögelein	<i>Cephalanthera damasonium</i>	Cefalantera bianca	85
Weisszunge	<i>Pseudorchis albida</i>	Orchide candida	75
Widerbart	<i>Epipogium aphyllum</i>	Epipogio	97
Wohlriechende Handwurz	<i>Gymnadenia odoratissima</i>	Manina profumata	59
Zierliches Wollgras	<i>Eriophorum gracile</i>	Pennacchi gracili	23
Zwergorchis	<i>Chamorchis alpina</i>	Gramignola alpina	53
Zwerg-Rohrkolben	<i>Typha minima</i>	Lisca minore	35





Weitere Informationen

Verordnung über den Natur- und Heimatschutz,
Art. 20 Abs. 1 und 3, Anhang 2

Kantonale Natur- und Heimatschutzverordnung,
Art. 1 Abs. 2 lit.a, Art. 10 Abs. 1

Flora, Moose und Flechten in Graubünden, Amt für Natur und Umwelt Graubünden

Lebensräume, Amt für Natur und Umwelt Graubünden

www.infoflora.ch

Flora Helvetica

Kontakt

Amt für Natur und Umwelt Graubünden
info@anu.gr.ch



info@infoflora.ch

Impressum

Herausgeber Amt für Natur und Umwelt Graubünden

Text Christine Huovinen,
dinatum klg, Davos

Copyright Karten Bundesamt für Landestopografie swisstopo

Grafik Süsskind SGD, Chur

Erstellt 2024 / 2025



Amt für Natur und Umwelt
Uffizi per la natura e l'ambient
Ufficio per la natura e l'ambiente