

## ***Tettigonia caudata*, Östliches Heupferd**

**Rote Liste:** VU (verletzlich)

**Verbreitung in Graubünden:** Unterengadin bis Zernez, Münstertal. Von 1'000 m.ü.M. bis auf 1'800 m.ü.M..

**Lebensraum:** Langgrasige Wiesen, Weiden, Böschungen, Säume etc., Getreidefelder. Sie kann auch in intensiv bewirtschafteten Flächen vorkommen. In der Schweiz kommt sie nur in Gebieten mit Getreideanbau vor.

**Nahrung:** Vorwiegend verschiedene, z. T. auch recht grosse Insekten. Gelegentlich auch pflanzliche Nahrung.

**Phänologie und Entwicklungsbiologie:** Normalerweise 1 Generation/2 Jahr.

**Imagines:** Juli – September, mit Maximum im August.

**Eiablage:** Juli – September. Die Eier werden in den Boden eingestochen und überwintern 2-mal, teilweise auch mehrmals.

**Larvenentwicklung:** Etwa Mai – August.

### **Massnahmen:**

- Erhalten und fördern eines möglichst extensiven Getreideanbaus (Gerste, Roggen, allenfalls Sommerweizen, aber nicht Mais) im Engadin und Münstertal.
- Fördern von Buntbrachen und Ackerschonstreifen in bzw. am Rande von Getreidefeldern.
- Fördern von Altgrasstreifen und Säumen mit Schnittermin ab Oktober.

