

# MASSNAHMENKATALOG

Territorium Ftan bis Zernez

Situation von Wald und Wild in den Flächen mit wildbedingten Verjüngungsproblemen sowie zu treffende Massnahmen

Erw.: gemeinsame Erwägungen AfW/AJF

Abkürzungen in der Spalte Situation Wald:

- vw W = Verjüngungsproblem/-ausfall vorwiegend Wildeinfluss
- W/Li = Wildeinfluss kombiniert mit zuwenig Licht
- W/Sto = Wildeinfluss kombiniert mit ungünstigem Standort
- W/Fa = Wildeinfluss kombiniert mit weiteren ungünstigen Faktoren (Bsp. Beweidung)
- EF = Erfahrung
- BK = Bestandeskartierung
- WZ = Wildzaun
- TP = Teilprogramm

Abkürzungen in der Spalte Situation Wild:

- Wi = Winter
- So = Sommer

Zuoz, den 15.2.08

Fläche	Lokalname, Gemeinde	Situation Wald (AfW)	Situation Wild (AJF)	Massnahmen in den nächsten 5 – 10 Jahren	Priorität	Anteil Hirsch SNP	Kontrolle
512	God Baselgia, Ftan	vw W ; TP ; teilweise Lichtmangel im östlichen Teil der Schadenfläche, v.a. im Val Tasna.	Hauptsächlich Gemswild So + Wi. Im östl. Teil guter Rehbestand. Wenig Hirsche. In den letzten Jahren mehrere Abschüsse durch Wildhut. Vor 2 Jahren Höhenlimite von 1'800 auf 1'600 müM gesenkt, neu wurde sie wieder auf 1'800 müM angehoben, da Gams sonst zu wenig bejagt wird.	Verjüngungsschläge im östlichen, Wildschutzmassnahmen im westlichen Teil (BSF). Höhenlimite Gams auf 1'800 müM belassen. Sollabschüsse zur Erreichung des Nachjagd – Zieles prioritär hier erfüllen.	3	25 %	In die Beobachtung der Jungwaldentwicklung auch den Wald bei ‚Padnal‘ miteinbeziehen !
514	Victur, Ftan	vw W ; WZ ; Aufforstungen auf ehemaligen Waldweidegebieten.	Guter Wintereinstand Hirsch. Rehe vorhanden.	Dickungs-/Stangenholzpflege, keine weiteren Verjüngungsmassnahmen			
516	God Plan, Traversinas, Ftan	vw W ; WZ ; Wintereinstand; Licht genügend. Wildschutzzäune vorhanden.	Ganzjährige Gamspopulation, 15-20 Stk. Einzelne Hirsche und Rehe.	Kontrolle und Unterhalt der Wildschutzzäune; sonst keine Massnahmen.			
504	Magnacun, Ardez	vw W ; EF ; sehr trocken; teilweise üppiger Graswuchs.	Ganzjähriger mittlerer Reh-Einstand Guter Wintereinstand für Hirsch.	mittelfristig keine Massnahmen			
506	God Grond, Ardez	W/Sto ; EF ; stellenweise üppige Vergrasung; teilweise Beweidung	Ganzjährig Reh-Einstand => mittlerer Bestand. Kein idealer Hirscheinstand weder Sommer noch Winter.	Einleiten der Verjüngung (über Sammelprojekt). Es ist geplant, die Beweidung abzulösen.			
507	Tantersassa, Ardez	vw W ; WZ ; Trockenheit erschwerend für die natürliche Verjüngung; zahlreiche Aufforstungen. Es sind 5 Wildschutzzäune à ca. 50 x 50 m vorhanden, in deren Schutz auch Naturverjüngung gedeiht.	Sehr guter Wintereinstand für Hirsch/Gäms/Steinwild Bereits grosse Fläche eingezäunt. Guter Sommer-/Wintereinstand für Rehwild → mittlerer Bestand.	Jungwaldpflege in den Einzäunungen, ansonsten mittelfristig keine weiteren Massnahmen. Sollabschüsse zur Erreichung des Nachjagd – Zieles prioritär hier erfüllen.			
511	Balsters, Ardez	vw W ; TP ; Futterstelle; verjüngungsfreundlicher Standort.	Ganzjährig Reh-Einstand → mittlerer Bestand. Guter Wintereinstand für Hirsch. Kleiner Standwildbestand im Sommer. Keine Winterfütterung mehr.	Keine Massnahmen, Verjüngungsschläge sind bereits ausgeführt worden.			
503	Clüsiflur, Guarda	W/Sto ; TP ; guter Untergrund; Wintereinstand; üppiger Graswuchs, teilweise Alpenrosen. In den letzten Jahren chemischer Einzelschutz.	Ganzjährig Reh-Einstand → mittlerer Bestand. Hirsche nur im Wi.	Chemischer Einzelschutz. Sollabschüsse zur Erreichung des Nachjagd – Zieles prioritär hier erfüllen.	2	0 %	
723	Las Craistas, Lavin	W/Sto ; BK ; Verbiss für Wfö, Lä und lokal auch Fi zu hoch; trocken.	Ganzjährig Reh-Einstand → mittlerer Bestand. Hirsche nur im Wintereinstand. Eingezäunter Biotop vorhanden.	Verjüngungsschläge ausgeführt, keine weiteren Massnahmen.			
724	God Laret, Lavin	vw W ; TP ; Verbiss für Lä und lokal auch Fi zu hoch. Es ist sicher genügend Licht vorhanden. Schürfungen ergeben gut Ansamung, dann aber stagniert die Verjüngung wegen Verbiss.	Ganzjährig Reh-Einstand → guter Bestand. Hirsche nur im Wintereinstand. Guter Gämseinstand Sommer und Winter. Wildwiese → Hegearbeit.	Erw.: Klasischer Konflikt, da gleichzeitig Schutzwald und wichtiger Wintereinstand. Lokal Förderung der Verjüngung durch entsprechende Holzschläge, Jungwaldpflege.	1	50 %	Evtl. einrichten von Kontrollflächen.
725	Dors, Lavin	W/Sto ; EF ; Verbiss für Lä, Wfö und lokal auch für Fi zu hoch; trocken.	Guter Winter-/Frühlingseinstand für Hirsch/Gäms/Steinwild. Mittlerer Rehbestand im Sommer.	waldbauliche Massnahmen sind im Rahmen WB Dors bereits ausgeführt worden.	1	50 %	

715	God Mundies, Susch	vw W ; TP ; Verbiss für Fi grösstenteils tragbar, lokal zu hoch; für Lä und Wfö zu hoch. Dank grosszügigen Verjüngungsschlägen ist genügend Licht vorhanden.	Idealer Wintereinstand für alle Wildarten. Sommereinstand für Reh/Gäms, kleiner Hirsch Standwildbestand.	Verjüngungsschläge bereits ausgeführt, lokal evtl. Wildschutzmassnahmen (Zäune) ergreifen.			Untersuchungsfläche einrichten, auch im Hinblick auf Ausdehnung der Verjüngungsschläge Richtung Norden.
716	Davo Chamonna / Arpiglettas, Susch	W/Li ; BK ; Verbiss für Lä und Wfö zu hoch; Vobe fällt wildbedingt aus.	Hirscheinstand So-/Winter = kleiner Bestand. Ganzjährig Reh-Einstand → mittlerer Bestand. Kurzer Aufenthalt an Hirschwild im Frühjahr (wenige Tage) → Wanderung Richtung SNP. Bejagung in den letzten Jahren gut.	Jungwaldpflege weitgehend ausgeführt, mittelfristig keine weiteren Massnahmen. Wirkung der neuen Wildasyle Sagliains / Champatsch beobachten.			
717	Guadatsch, Susch	W/Li ; BK ; Verbiss für Lä und Wfö zu hoch; Vobe fällt wildbedingt aus.	Hirscheinstand So-/Winter = kleiner Bestand. Ganzjährig Reh-Einstand → mittlerer Bestand. Einzelne Gämsen im Winter. Kurzer Aufenthalt an Hirschwild im Frühjahr (wenige Tage) → Wanderung Richtung SNP. Biotop vorhanden. Bejagung in den letzten Jahren gut.	Wirkung der neuen Wildasyle Sagliains / Champatsch beobachten, sonst keine Massnahmen.			
718	Chaschinas, Susch	W/Li ; BK ; Verbiss für Lä zu hoch; Vobe fällt wildbedingt aus.	Hirsche nur im Wintereinstand. Ganzjährig Reh-Einstand → mittlerer Bestand. Kurzer Aufenthalt an Hirschwild im Frühjahr (wenige Tage) → Wanderung Richtung SNP. Bejagung in den letzten Jahren gut.	Verjüngungsschläge mit Hauptaugenmerk auf die Verjüngung der Lä. Wirkung der neuen Wildasyle Sagliains / Champatsch beobachten.			
720	God Valata, Susch	W/Li ; EF ; Verbiss für Lä und Wfö zu hoch.	Ganzjährig Reh-Einstand → mittlerer Bestand. Guter Wintereinstand für Hirschwild. Biotopzaun im 2001 entfernt.	Verjüngungsschlag im westlichen Teil ausgeführt, mittelfristig Fortsetzung im östlichen Teil	2	25 %	
721	God da Raglia / Sur Sasslatsch, Susch	W/Li ; EF ; Verbiss für Lä und Wfö zu hoch.	Idealer Wintereinstand für alle Wildarten. Sommereinstand für Reh, kleiner Hirsch Standwildbestand. Bauernhof Müller → Winteranziehungspunkt (Futteraufnahme !!). Verkehrsunfälle mit Reh-/Hirschwild!	Verjüngungsschläge im südlichen Teil ausgeführt, evtl. nachträglicher Bau von Wildzäunen	2	25 %	

722	Foura da Baldirun / Las Tagliadas, Susch	W/Li ; BK ; Verbiss für Wfö, Lä und lokal auch Fi zu hoch.	Ganzjährig Reh-Einstand → mittlerer Bestand. Guter Wintereinstand für Hirschwild. Aufenthaltsgebiet der mit Sendern markierten SNP Hirsche "Il Fuorn". Kleiner Hirsch Standwildbestand im Sommer. Einzelne Gämsen im Winter.	Keine Massnahmen; kommt als Waldreserve in Frage.			
701	God Plan dals Bouvs, Zernez	W/Li ; EF ; Verbiss bei Fi tragbar; für Lä und Wfö ist der Verbissdruck zu hoch; Vobe fällt wildbedingt aus.	Sehr guter Gämsbestand im Sommer und Winter. Wenig Reh-/Hirschwild im Sommer. Grenze zu SNP.	Mittelfristig keine Massnahmen. Optimierung der Nachjagd durch verbesserte Koordination mit der Bejagung benachbarter Hirschareale (talaufwärts - gleichzeitiger Jagdbeginn)			
702	God Cumün suot, Zernez	W/Li ; TP ; Verbiss bei Fi tragbar; für Lä (Wfö) ist der Verbissdruck zu hoch; Vobe fällt wildbedingt aus.	Sehr guter Rehbestand Sommer Herbst. Mittlerer Bestand im Winter. Sehr guter Hirschbestand Herbst/Winter/Frühling. Sehr guter Gämsbestand Herbst und Winter. Nähe SNP Grenze.	Windwurf Ende 90er Jahre, genügend Licht für Verjüngung vorhanden, keine weiteren Massnahmen. Optimierung der Nachjagd durch verbesserte Koordination mit der Bejagung benachbarter Hirschareale (talaufwärts - gleichzeitiger Jagdbeginn).			
703	God God dimez, Zernez	vw W ; Erfahrung aufgrund eines Verjüngungsschlages ; Verbiss bei Fi tragbar; für Lä (Wfö) ist der Verbissdruck zu hoch; Vobe fällt wildbedingt aus.	Sehr guter Gämsbestand Herbst/Winter/Frühling. Mittlerer Rehwildbestand. Wenig Hirschwild. Nähe SNP Grenze. Seit 2 Jahren ist die Höhenlimite für die Gamsbejagung aufgehoben (→ bis zur NP-Granze gute Bejagbarkeit).	Verjüngungsschläge ausgeführt, keine weiteren Massnahmen. Damit wird aber das WEP-Ziel mit höherem Lä- und WFö – Anteil verfehlt. Es ist mit einer Verbesserung der Situation dank Anhebung der Höhenlimite bei der Gamsbejagung zu rechnen. Optimierung der Nachjagd durch verbesserte Koordination mit der Bejagung benachbarter Hirschareale (talaufwärts - gleichzeitiger Jagdbeginn).	3	100 %	Für Kontrolle geeignet.
704	God Foppas / Ruinas, Zernez	vw W ; EF ; Verbiss bei Fi tragbar; für Lä und Wfö ist der Verbissdruck zu hoch; Vobe fällt wildbedingt aus.	Guter Rehbestand Sommer und Winter. Hoher Hirschbestand im Herbst und Frühling bei Aus- und Einwanderung des SNP-Cluozza Bestandes. (Nur kurze Zeit). Wenig Hirsche im Winter. Wintereinstand für Gämswild SNP Murtaröl. Rehbejagung läuft hier optimal.	Verjüngungsschläge ausgeführt, keine weiteren Massnahmen. Optimierung der Nachjagd durch bessere Koordination mit Bejagung im benachbarten Hirschareal talaufwärts. Verstärkung der Rehbejagung wünschbar, aber kaum möglich; das neue Rehbejagungskonzept wird seine Wirkung möglicherweise aber erst noch entfalten.	1	100 %	
705	Üert da Champsech, Zernez	W/Sto ; BK ; Verbiss bei Fi an der oberen Grenze; Verbiss bei Wfö zu hoch.	Sehr kleiner Rehbestand im Sommer. Keine Rehe im Winter. Hoher Hirschbestand im Herbst und Frühling bei Aus- und Einwanderung des SNP-Ofenpass Bestandes. (Nur kurze Zeit). Keine Hirsche im Winter. Guter Gämsbestand im Sommer und Winter.	Keine Massnahmen.			
706	Muottas , Zernez Champsech	W/Sto ; BK ; Verbiss bei Fi an der oberen Grenze; Verbiss bei Wfö zu hoch.	Wie 705	Keine Massnahmen.			

708	God da las Chasetas, Zernez	W/Sto ; BK ; Verbiss für Lä und Wfö zu hoch.	Idealer Winterestand für alle Schalenwildarten. Guter Rehbestand während des ganzen Jahres. Gute Gämsbestände im Sommer. Sehr wenig Hirschwild im Sommer.	Erw.: Intensive Herbstjagd bereits seit Anfang der Herbstjagden. Verjüngungsschläge, Wildschutzmassnahmen in Form von stützpunktartigen Zäunen mit Schürfungen.	3	100 %	Keine Kontrolle nötig, da Situation offensichtlich ist.
709	Sur la Galleria, Zernez	W/Sto ; BK ; Verbiss für Lä und Wfö zu hoch.	Wie 708	Wie 708	2	100 %	Keine Kontrolle nötig, da Situation offensichtlich ist.
710	God Baselgia , God dal Müt, Crap ot, Frattas / Bagnuors suot, Zernez	vw W ; BK ; Verbissdruck für alle Baumarten zu hoch, lokal für Fichte tragbar.	Idealer Winterestand für alle Schalenwildarten (Steinwild in den oberen Teilen). Guter Rehbestand während des ganzen Jahres. Gute Gämsbestände im Sommer. Sehr wenig Hirschwild im Sommer. Herbstjagd seit Anfang dieser Jagdart immer intensiv.	Erw.: Probleme unausweichlich. Verjüngungsschläge, Wildschutzmassnahmen mittels stützpunktartigen Zäunen, in denen auch geschürft wird.	3	100 %	Keine Kontrolle nötig, da Situation offensichtlich ist.
714	Muotta Crastatscha, Zernez	vw W ; EF ; Verbiss für Fi grösstenteils tragbar, lokal zu hoch; für Wfö und Lä zu hoch. Blockschutt, Bedeutung für Holz-nutzung gering.	Sehr guter Winterstand für Hirsch und Reh. Guter Rehbestand während des ganzen Jahres. Wenig Gämswild im Winterstand.	Keine Massnahmen.			-